

2. Feladatsor

Komplex számok, vektorok

1. Feladat: Oldjuk meg a következő egyenleteket és adjuk meg a megoldást algebrai alakban!

$$a) 2z^2 = \bar{z}, \quad b) iz^2 + (2 - 4i)z - 4 - i = 0$$

2. Feladat: Legyen az $\{a, b, c\}$ vektorrendszer lineárisan független. Döntsük el, hogy az $\{r, s, t\}$ vektorrendszer lineárisan független-e! Állításainkat igazoljuk!

$$\begin{aligned} a) \quad & r = 3a + 2b + c \quad s = 5a - 3b - 2c \quad t = 0, \\ b) \quad & r = 3a - b - c \quad s = 2a + b + 2c \quad t = a - 2b - 3c, \\ c) \quad & r = a + b + c \quad s = -a + c \quad t = a - b + c, \end{aligned}$$

3. Feladat: Az a, b, c és v vektorokat (az $\{i, j, k\}$ alapvektorrendszerre vonatkoztatott) koordinátaikkal adtuk meg. Fejezzük ki a v vektort az a, b és c vektorok lineáris kombinációjaként, ha lehetséges!

$$a = [1, 0, 0], \quad b = [0, 1, 0], \quad c = [1, 1, 0], \quad v = [2, 1, 3]$$

4. Feladat: Az a és b vektorok szöge $\frac{\pi}{3}$, abszolút értékük: $|a| = 3$ és $|b| = 4$. Számítsuk ki az alábbi skaláris szorzatok értékét!

$$a) ab \quad b) a^2 \quad c) (a + b)^2 \quad d) (3a - 2b)^2$$

5. Feladat: Az a, b, c vektorrendszer az α paraméter mely értékeinél lineárisan független, és mely értékeinél lineárisan függő?

$$\begin{aligned} a) \quad & a = [\alpha, 1, 2], b = [3, -1, 0], c = [2, 1, 0] \\ b) \quad & a = [3, \alpha, 0], b = [0, 3, \alpha], c = [1, 0, -1] \end{aligned}$$

További feladatok gyakorláshoz az alábbi feladatgyűjteményben találhatóak.