

3. Feladatsor

Vektorok - Megoldások

1. Feladat: Oldjuk meg a következő egyenleteket és adjuk meg a megoldást algebrai alakban!

$$\begin{array}{lll} a) 2z^2 = \bar{z}, & b) |z| + z = 5 - i & c) iz^2 + (2 - 4i)z - 4 - i = 0 \\ & d) z^2 - (4 - 2i)z + 4 - 4i = 0 \end{array}$$

Megoldás:

$$a) z = a + bi \longrightarrow 2z^2 = 2(a + bi)^2 = a - bi \longrightarrow 2(a^2 + 2abi - b^2) = a - bi$$

Felbontjuk valós és képzetes részre:

$$\text{- valós: } 2a^2 - 2b^2 = a$$

$$\text{- képzetes: } 4abi = -bi$$

$$b(4a + 1) = 0 \longrightarrow b = 0 \quad \text{vagy} \quad a = -\frac{1}{4}$$

$$1. \text{ eset } (b = 0): 2a^2 - a = 0 \longrightarrow a(2a - 1) = 0 \longrightarrow z_1 = 0; \quad z_2 = \frac{1}{2}$$

$$2. \text{ eset } (a = -\frac{1}{4}): 2\left(-\frac{1}{4}\right)^2 - 2b^2 = -\frac{1}{4} \longrightarrow 2b^2 = \frac{3}{8} \longrightarrow b^2 = \frac{3}{16} \longrightarrow$$

$$b = \pm \frac{\sqrt{3}}{4} \longrightarrow z_3 = -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i; \quad z_4 = -\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$$

$$b) z = a + bi \longrightarrow \sqrt{a^2 + b^2} + a + bi = 5 - i$$

Felbontjuk valós és képzetes részre:

$$\text{- képzetes: } bi = -i \longrightarrow b = -1$$

$$\text{- valós: } \sqrt{a^2 + (-1)^2} + a = 5 \longrightarrow \sqrt{a^2 + 1} = 5 - a$$

$$\text{Négyzetre emelve } (5 - a \geq 0 \longrightarrow a \leq 5): a^2 + 1 = (5 - a)^2 = 25 - 10a + a^2 \longrightarrow 1 = 25 - 10a \longrightarrow 10a = 24 \longrightarrow a = \frac{12}{5}$$

$$z = \frac{12}{5} - i$$

$$c) z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(2 - 4i) \pm \sqrt{(2 - 4i)^2 - 4 \cdot i \cdot (-4 - i)}}{2i} =$$

$$\begin{aligned}
& \frac{-2+4i \pm \sqrt{(4-16i-16) - (-16i+4)}}{2i} = \frac{-2+4i \pm \sqrt{-12-16i+16i-4}}{2i} = \\
& \frac{-2+4i \pm \sqrt{-16}}{2i} = \frac{-2+4i \pm 4i}{2i} \rightarrow z_1 = \frac{-2+4i+4i}{2i} = \frac{-2+8i}{2i} = \\
& \frac{-1+4i}{i} = 4+i; z_2 = \frac{-2+4i-4i}{2i} = \frac{-2}{2i} = -\frac{1}{i} = i \\
\text{d) } z_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-(4-2i)) \pm \sqrt{(-(4-2i))^2 - 4 \cdot 1 \cdot (4-4i)}}{2 \cdot 1} = \\
& \frac{4-2i \pm \sqrt{(16-16i-4) - (16-16i)}}{2} = \frac{4-2i \pm \sqrt{12-16i-16+16i}}{2} = \\
& \frac{4-2i \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{4-2i \pm 2i}{2} \rightarrow z_1 = \frac{4-2i+2i}{2} = \frac{4}{2} = 2; \\
& z_2 = \frac{4-2i-2i}{2} = \frac{4-4i}{2} = 2-2i
\end{aligned}$$

2. Feladat: Legyen az $\{a, b, c\}$ vektorrendszer lineárisan független. Döntsük el, hogy az $\{r, s, t\}$ vektorrendszer lineárisan független-e! Állításainkat igazoljuk!

$$\begin{aligned}
\text{a) } & r = 3a + 2b + c \quad s = 5a - 3b - 2c \quad t = 0, \\
\text{b) } & r = 3a - b - c \quad s = 2a + b + 2c \quad t = a - 2b - 3c, \\
\text{c) } & r = a + b + c \quad s = -a + c \quad t = a - b + c,
\end{aligned}$$

Megoldás:

a) A vektorrendszer nem lineárisan független, mivel $t = 0$ (a zéróvektor), a három vektor között azonnal fennáll egy nemtriviális lineáris kombináció:

$$0 \cdot r + 0 \cdot s + 1 \cdot t = 0.$$

Ez nem a triviális ($\alpha = \beta = \gamma = 0$) megoldás, tehát a $\{r, s, t\}$ vektorrendszer lineárisan függő.

b) A vektorrendszer lineárisan függő, mivel $t = r - s$.

c) A vektorrendszer lineárisan független, mivel ha

$$\alpha r + \beta s + \gamma t = 0,$$

akkor

$$\alpha(a+b+c) + \beta(-a+c) + \gamma(a-b+c) = (\alpha-\beta+\gamma)a + (\alpha-\gamma)b + (\alpha+\beta+\gamma)c = 0.$$

Mivel a, b, c függetlenek, ezért

$$\alpha - \beta + \gamma = 0, \quad \alpha - \gamma = 0, \quad \alpha + \beta + \gamma = 0.$$

Egyenletrendszer megoldása $\alpha = \beta = \gamma = 0$, tehát csak a triviális kombináció adja a nullvektort.

3. Feladat: Az a és b vektorok szöge $\frac{\pi}{3}$, abszolút értékük: $|a| = 3$ és $|b| = 4$. Számítsuk ki az alábbi skaláris szorzatok értékét!

$$a) ab \quad b) a^2 \quad c) (a+b)^2 \quad d) (3a-2b)^2$$

Megoldás:

$$a) ab = |a| \cdot |b| \cdot \cos \text{szög}_{ab} = 3 \cdot 4 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

$$b) a^2 = |a| \cdot |a| \cdot \cos \text{szög}_{aa} = 3 \cdot 3 \cdot \cos 0 = 3 \cdot 3 \cdot 1 = 9$$

$$c) (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 9 + 2 \cdot 6 + |b| \cdot |b| \cdot \cos 0 = 9 + 12 + 4 \cdot 4 \cdot 1 = 37$$

Azért bonthattuk így ki a négyzetre emelt összeget, mivel a skaláris szorzás kommutatív és a vektorösszeadásra nézve disztributív.

$$d) (3a-2b)^2 = 9a^2 - 12ab + 4b^2 = 9 \cdot 9 - 12 \cdot 6 + 4 \cdot 16 = 73$$

4. Feladat: Az a, b, c vektorrendszer az α paraméter mely értékeinél lineárisan független, és mely értékeinél lineárisan függő?

$$a) a = [\alpha, 1, 2], b = [3, -1, 0], c = [2, 1, 0]$$

$$b) a = [3, \alpha, 0], b = [0, 3, \alpha], c = [1, 0, -1]$$

Megoldás:

Akkor lesz lineárisan függő a vektorrendszer, ha a 3 vektor vegyes szorzata 0 (ugyanis ez azt jelenti, hogy egy síkba esnek).

a) A vegyes szorzat kiszámításánál kiesik az α -t tartalmazó tag, és mivel a vegyes szorzat értéke $10 \neq 0$, ezért minden α -ra független lesz a vektorrendszer. Kifejtve:

$$(a \times b) \cdot c = \det \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 2 \cdot (-1)^{1+3} \det \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 2 \cdot (3 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) = 2 \cdot (3+2) = 10 \neq 0.$$

b) Ha $\alpha = -3$ vagy $\alpha = 3$, akkor a vegyes szorzat értéke 0, ezért függő lesz a vektorrendszer, minden más α -ra független. Kifejtve:

$$(a \times b) \cdot c = \det \begin{bmatrix} 3 & \alpha & 0 \\ 0 & 3 & \alpha \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Fejtsük ki a determinánst az első sor szerint:

$$\begin{aligned} \det &= 3 \cdot \det \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} - \alpha \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & \alpha \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= 3 \cdot (3 \cdot (-1) - \alpha \cdot 0) - \alpha \cdot (0 \cdot (-1) - \alpha \cdot 1) + 0 \\ &= 3 \cdot (-3) - \alpha \cdot (-\alpha) = -9 + \alpha^2 = \alpha^2 - 9. \end{aligned}$$

A vektorrendszer akkor lineárisan függő, ha a vegyes szorzat 0:

$$\alpha^2 - 9 = 0 \implies \alpha^2 = 9 \implies \alpha = \pm 3.$$